

白姑鱼

1

弗氏绒须石首鱼

白姑鱼

2

- 白姑鱼(弗氏绒须石首鱼) 是布宜诺斯艾利斯声沿海渔业的重要组成部分。每年的6月到9月间, 在桑菠萝本海湾区和阿根廷乌拉圭共同经济区(ZCPAU), 主要由海湾或河口的沿海船队完成捕捞。

白姑鱼

3

- 白姑鱼品种繁多，堪称“布宜诺斯艾利斯多样的海岸”。
- 2009年12月：渔业联邦委员会发布第27/09号决议，确定了该品种的捕捞种类和区域，同时也规定了封闭的和禁捕区域和品种。
- 通过第CFP N° 02/2010号决议，确定了“爱尔林垦”地区为严格禁止区
- 通过第N° 55/2009号记录， CFP向相关部门定期提供船队捕捞和运行的情况。
- 所有上述管理措施使得白姑鱼成为“多样海岸”中的主要捕捞品种。


产量变化

4


- 1992年到1997年产量达到顶峰, 1995年接近3万吨, 而到了1998年又回落到了9500吨.
- 从2004年开始一直到2006年捕捞量呈现上升趋势, 直到2011年都稳定在2.5万吨左右。
- 近些年持续稳定增长, 2013年达到历史新高 (4.55万吨)。

产量变化

5



每年的6月，7月，8月和9月是主要捕鱼季节，根据最近十年(2003-2013). 平均月产量分析，这段时间的白姑鱼产量最大。



不同形式船队捕捞白姑鱼的吨位数

7

- 主要捕捞白姑鱼的船队是“沿海”渔船，占最近十年产量的57%，而后是“海湾或河口”渔船，占37.4%，最后一位是鲜渔船占5.6%。

不同形式船队捕捞白姑鱼的吨位数

年份	海湾或河口	沿海	鲜渔船
2003	4. 854, 6	6. 403, 2	296, 1
2004	5. 745, 3	5. 181, 0	143, 1
2005	14. 063, 7	6. 902, 5	1. 035, 5
2006	12. 743, 6	13. 037, 9	1. 007, 2
2007	7. 810, 8	16. 392, 0	1. 359, 7
2008	9. 858, 5	11. 548, 8	1. 009, 6
2009	9. 133, 3	16. 073, 7	1. 413, 3
2010	10. 093, 0	12. 637, 6	2. 526, 2
2011	5. 856, 8	17. 967, 2	854, 9
2012	11. 398, 7	24. 005, 1	2. 378, 5
2013	12. 993, 4	29. 012, 4	3. 505, 2
2003-2013 平均数	9. 504, 7	14. 469, 2	1. 411, 8
2003-2013 百分比	37, 4	57, 0	5, 6

捕捞区域

9

- 主要捕捞区域为桑菠萝本海湾区和ZCPAU。
- 2013年70%的捕捞工作在白金海港口，30%在布宜诺斯艾利斯省其它吨位较小的港口进行（撒拉多河，格拉尔·拉瓦耶，圣格来门特，安瑟那达等）。

2013年CFP和布宜诺斯艾利斯省采取的影响白姑鱼的管理措施

10

- 每年按照海疆联合技术委员会 (CTMFM) 的规定，和乌拉圭共和国共同确定管理措施。
- CTMFM确定规定范围内允许总捕捞量 (CTP) ，产量达到CTP以后的禁止捕鱼。
- 根据10/2000号决议，CTMFM禁止在超过28米的渔船在ZCPAU实施深海拖网捕鱼，以减少资源压力，保护合理开发。